

Podicipediformes

Morfologie

Znaky odlišné od potáplík

- prachový šat mláďat - 1
- flexe prstů - bez rotace
- mláďata – semi-nidifugní
- Nemají rýdovací pera



Sklony k nelétavosti!

*Aechmophorus
occidentalis*

Fylogeneze

Division 1

Cohort Gavio-impennes

Order Sphenisciformes; Spheniscidae, Penguins

Order Gaviiformes: Gaviidae, Loons

Podicipedidae, Grebes

Cohort Stegano-tubinares

Order Procellariiformes

Suborder Diomedae; Diomedeidae, Albatrosses

Suborder Procellariae; Hydrobatidae, Storm Petrels
Procellariidae, Shearwaters, etc.

Order Pelecaniformes

Suborder Phaethontes, Phaethontidae, Tropicbirds

Suborder Steganopodes

Infraorder Fregatae; Fregatidae, Frigatebirds

Infraorder Pelecani

Superfam. Pelecanoidea; Pelecanidae, Pelicans

Superfam. Sulidoidea; Sulidae, Boobies, Gannets

Phalacrocoracidae, Cormorants, Anhingas

Suborder Ciconii

Infraorder Falconides

Parvorder Accipitrida

Family Accipitridae

Subfamily Pandioninae: Osprey

Subfamily Accipitrinae: Eagles, Old World Vultures, Hawks, Kites,
Harriers

Family Sagittariidae: Secretary-bird

Parvorder Falconida

Family Falconidae: Falcons, Caracaras

Infraorder Ciconiides

Parvorder Podicipedida

Family Podicipedidae: Grebes

Parvorder Phaethontida

Family Phaethontidae: Tropicbirds

Parvorder Sulida

Superfamily Suloidea

Family Sulidae: Boobies, Gannets


Family Anhingidae: Anhingas, Darters


Superfamily Phalacrocoracoidea

Family Phalacrocoracidae: Cormorants, Shags


**Sibley & Ahlquist 1990,
DNA-DNA hybridizace**

(Mayr & Clarke
2003, anatomie)






(Mayr, 2004 – anatomie)




(Hackett et al. 2008, DNA)



Jarvis et al. 2014,
sekvenace celých genomů

Podicipedidae

(6/22)







Tachybaptus ruficollis (Starý svět)



Tachybaptus ruficollis – prostý šat



Australasian Grebe

Sherwood Arboretum, SE Qld

© Tom Tarrant Nov 2003

Tachybaptus novaehollandiae (Austrália, NZ, PNG)



© 2001 Allen Chartier

Tachybaptus dominicus (S. a J. Amerika)



Podilymbus podiceps (Nový Svět)



Podilymbus podiceps - mládě



Podilymbus gigas (j. Atitlán)
nelétavý, žral korýše



Rollandia rolland (J. Amerika)




Rollandia microptera (j. Titicaca)
nelétavá



Hoary-headed Grebe *Poliocephalus poliocephalus*
©Paul Hackett 2002


Poliocephalus poliocephalus (Austrálie)




Poliocephalus rufopectus (NZ)



Podiceps cristatus (Starý svět)





Podiceps grisegena (Holarktida)



Podiceps auritus (Holarktida)



Podiceps nigricollis (Holarktida, Afrika)



Podiceps tacczanowski – nelétavá (j. Junin)



Podiceps gallardoi – nelétavá (Argentina)



Aechmophorus occidentalis (S. Am.)





Aechmophorus occidentalis - námluvy

Phoenicopteriformes

Společné znaky řádu

- Desmogátní patro
- Zadní prst malý nebo chybí
- Srostlé karotidy
- Solné žlázy
- 11 RL
- Nidifugní mláďata
- Adaptace k filtraci
- Koloniální
- 1 vejce






© M. Watkinson



Podiceps cristatus



Phoenicopterus ruber

Division 3

Order Ciconiiformes

Suborder Ardeae; Ardeidae, Herons

Balaenicipitidae, Shoebill

Suborder Ciconiae

Infraorder Scopiae; Scopidae, Hammerhead

Infraorder Ciconii

Superfam. Threskiornithoidea; Threskiornithidae, Ibis, etc.

Superfam. Ciconoidea; Ciconiidae, Storks

Phoenicopteridae, Flamingos

Order Falconiformes

Suborder Cathartae, Cathartidae, New World Vultures

Suborder Accipitres

Infraorder Sagittarii; Sagittariidae, Secretarybird

Infraorder Falconi

Superfam. Strigoidea, Strigidae, Owls

Superfam. Falconoidea, Pandionidae, Osprey

Accipitridae, Accipitrinae, Hawks, Eagles

Falconinae, Falcons

(Cracraft 1981, morfologie)

Order CICONIIFORMES

Suborder Ciconii

Infraorder Ciconiides

Parvorder Ciconiida

Superfamily Ardeoidea

Family Ardeidae: Herons, Bitterns, Egrets

Superfamily Scopoidea

Family Scopidae: Hamerkop or Hammerhead

Superfamily Phoenicopteroidea

Family Phoenicopteridae: Flamingos

Superfamily Threskiornithoidea

Family Threskiornithidae: Ibises, Spoonbills

Superfamily Pelecanoidea

Family Pelecanidae

Subfamily Balaenicipitinae: Shoebill

Subfamily Pelecaninae: Pelicans


Superfamily Ciconioidea

Family Ciconiidae


Subfamily Ciconiinae: Storks, Openbills, Adjutants, Jabiru

Subfamily Cathartinae: New World Vultures


(Sibley & Ahlquist 1990, DNA hybridizace)



(Chubb 2004, DNA)



(Hackett et al. 2008, DNA)




(Prum et al. 2015) – 394 genů

Phoenicopteridae

(3/5)

Phoenicopteridae



Phoenicopterus ruber



Stř. Amerika, Eurasie, Afrika

Phoenicopterus ruber



Phoenicopterus ruber - odpočinek



Phoenicopterus ruber - námluvy



Phoenicopterus ruber - kolonie



Phoenicopterus ruber



Phoenicopterus roseus - hnízdo



© Ken Billington

Phoeniconaias minor



Afrika

Phoenicoparrus andinus



Andy

Phoenicopterus chilensis



Ciconiiformes

Společné znaky řádu

- Desmognátní patro
- Diastataxie
- Malá slepá střeva
- Tracheobronchální syrinx
- Dlouhé nohy



Některé odlišné znaky v rámci řádu

čeleď	RL	RP	drobivý prach	prachový šat ml. po vylíhnutí	nares perviale	blána mezi prsty (náznak)	urohydróza
Balaenicipitidae	11	12	+	-	-	-	+
Scopidae	10	12	-	+	?	+	-
Ardeidae	10-11	10,12	+	-	+	+	-
Ciconiidae	12	12	-	slabé opeření	+	+	+
Threskiornithidae	10	12	-	+	-	+	-

Division 3

Order Ciconiiformes

Suborder Ardeae; Ardeidae, Herons
Balaenicipitidae, Shoebill

Suborder Ciconiae

Infraorder Scopiae; Scopidae, Hammerhead

Infraorder Ciconii

Superfam. Threskiornithoidea; Threskiornithidae, Ibis, etc.

Superfam. Ciconoidea; Ciconiidae, Storks

Phoenicopteridae, Flamingos

Order Falconiformes

Suborder Cathartae, Cathartidae, New World Vultures

Suborder Accipitres

Infraorder Sagittarii; Sagittariidae, Secretarybird

Infraorder Falconi

Superfam. Strigoidea, Strigidae, Owls

Superfam. Falconoidea, Pandionidae, Osprey

Accipitridae, Accipitrinae, Hawks, Eagles

Falconinae, Falcons

(Cracraft 1981, morfologie)

Order CICONIIFORMES

Suborder Ciconii

Infraorder Ciconiides

Parvorder Ciconiida

Superfamily Ardeoidea

Family Ardeidae: Herons, Bitterns, Egrets

Superfamily Scopoidea

Family Scopidae: Hamerkop or Hammerhead

Superfamily Phoenicopteroidae

Family Phoenicopteridae: Flamingos

Superfamily Threskiornithoidea

Family Threskiornithidae: Ibises, Spoonbills

Superfamily Pelecanoidea

Family Pelecanidae

Subfamily Balaenicipitinae: Shoebill

Subfamily Pelecaninae: Pelicans


Superfamily Ciconioidea

Family Ciconiidae

Subfamily Ciconiinae: Storks, Openbills, Adjutants, Jabiru


Subfamily Cathartinae: New World Vultures

(Sibley & Ahlquist 1990, DNA hybridizace)




van Tuinen et al. (2001: fig. 2)

DNA



(Hackett et al. 2008,
DNA)




(Prum et al. 2015) – 394 genů

Ardeidae

(17/60)


- Ardeinae – denní volavky
- Nycticoracinae – noční volavky
- Tigrisomatinae – „Tiger-herons“
- Botaurinae – bukači a bukáčci

Ardeidae





© Julie M. Blalock








ARDEIDAE

ARDEINAE



day-herons
34 species
(*Syrigma*, *Pilherodius*, *Ardea*,
Egretta, *Bubulcus*, *Ardeola*,
Butorides, *Agamia*)

NYCTICORACINAE



night-herons
7 species
(*Nycticorax*, *Gorsachius*)

TIGRISOMATINAE



tiger-herons
5 species
(*Tigrisoma*, *Zonerodius*,
Tigriornis)

BOTAURINAE



bitterns
12 species
(*Ixobrychus*, *Botaurus*)

NYCTICORACINI

COCHLEARIINI

ZEBRILINI

BOTAURINI



Boat-billed Heron
1 species
(*Cochlearius*)



Zigzag Heron
1 species
(*Zebrilus*)

FAMILY

SUBFAMILY

TRIBE

Ardeinae



Ardea cinerea (Eurasie)

*Ardea
purpurea*

Eurasie



Ardea herodias



Nový svět



Agamia agami (J. Amerika)



Syrigma sibilatrix (J. Amerika)



Pilherodius pileatus (J. Amerika)



monacoeye.com

Egretta alba (Kosmopolitní)

Egretta garzetta



Egretta garzetta





Egretta ardesiaca (Afrika)

Bubulcus ibis



Kosmopolitní

Butorides striatus



© R. Janaswamy

Pantropický

Butorides striatus



©2005 CR

Nycticoracinae

Nycticorax nycticorax



Kosmopolitní

Gorsachius goisagi



JV Asie

Cochlearius cochlearius



J. Amerika

Cochlearius cochlearius



Tigrisomatinae

Tigrisoma mexicanum



J. Amerika

Botaurinae

Zebrilus undulatus



J. Amerika

Ixobrychus minutus



www.naturfoto.cz

© Jan Ševčík

Starý svět



© - lubomír - hlásek

www.hlasek.com

Ixobrychus minutus 31

Botaurus stellaris



© lubomir hlasek

www.hlasek.com

Botaurus stellaris 947


Botaurus stellaris



Scopidae

(1/1)

Scopidae



Scopus umbretta



© Yves Thonnereux
www.oiseaux.net

Afrika

Scopus umbretta



© - josef hlasek
www.hlasek.com
Scopus umbretta bt4597






Cicioniidae

(6/19)

- Mycteriini (*Mycteria*, *Anastomus*) – malí lesní čápi, hlavní potravou ryby a mlži, často koloniální
- Ciconiini (*Ciconia*) – středně velcí čápi většinou otevřených prostranství, oportunisté, vyjímečně koloniální.
- Leptoptilini (*Jabiru*, *Ephippiorhynchus*, *Leptoptilos*) – velcí čápi, mrchožřaví nebo rybožřaví, často koloniální.


Ciconiidae





© Roeselien Raimond | www.roeselienraimond.com





CICONIIDAE

MYCTERIINI



FAMILY

CICONIINI




'typical' storks
7 species
(*Ciconia*)

TRIBE

LEPTOPTILINI




'giant' storks
6 species
(*Ephippiorhynchus*, *Jabiru*,
Leptoptilos)



Slikas (1997) – cytochrom b, DNA hybridizace

Mycteriini

Mycteria ibis



© - josef hlasek
www.hlasek.com
Mycteria ibis a7749

Afrika

Mycteria ibis



WWW.NATURALSCENERY.CZ

Mycteria americana



Nový svět

Mycteria leucocephala



JV Asie

Anastomus oscitans

Narkotický sekret

JV Asie



Anastomus lamelligerus



Afrika

Ciconiini

Ciconia ciconia



Starý svět



© Herminio M. Muñiz


Ciconia nigra

© P. Dubois - 23.IV.2003

Ciconia nigra
Monfragüe (Espagne)



Ciconia abdimi
- koloniální



Afrika

Ciconia maguari – semikolonie



J. Amerika

Leptoptilini

Ephippiorhynchus asiaticus



JV Asie, Austrálie

Ephippiorhynchus senegalensis



© - josef hlasek

www.hlasek.com

Afrika

Ephippiorhynchus senegalensis a5321

Jabiru mycteria

ARKive
www.arkive.org



© Malcolm Schuyl / www.flpa-images.co.uk

J. Amerika

Jabiru mycteria



Leptoptilos crumeniferus



Afrika




Leptoptilos crumeniferus



Leptoptilus dubius

JV Asie



Leptoptilos javanicus




JV Asie

Balaenicipitidae

(1/1)

Balaenicipitidae



Balaeniceps rex



Afrika

Balaeniceps rex



© A. Froneman - 2000



© Christoph Breitkopf


Video: www.arkive.org

Threskiornithidae

(13/32)

- Threskiornithinae
- Plataleinae

Threskiornithidae





© Fran Trabalon



Threskiornithinae

***Threskiornis* – Afrika, Indie, Austrálie**

***Pseudibis* – JV Asie**

***Geronticus* – Afrika**

***Nipponia* – Čína**

***Bostrychia* – Afrika**

***Theristicus* – J. Amerika**

***Cercibis* – J. Amerika**


***Mesembrinibis* – J. Amerika**

***Phimosus* – J. Amerika**

***Eudocimus* – stř. a J. Amerika**

***Plegadis* – J. Amerika, *P. falcinellus* kosmopolitní**

***Lophotibis* - Madagaskar**



Threskiornis aethiopicus



Afrika

Threskiornis molucca



Austrálie

Threskiornis spinicollis



Austrálie

Pseudibis papillosa



Asie

Geronticus eremita



Afrika, Evropa

Geronticus calvus



Afrika

© Steve Bladon Birdlife Photography - May 2008

Bostrychia hagedash



© Yves Thonnerieux
www.oiseaux.net

Afrika, mláďata mají drápy v křídlech

Theristicus melanopis



J. Amerika

Phimosus infuscatus



J. Amerika

Eudocimus albus



Nový svět

Eudocimus ruber



[o] PHOTOMECAN .EU

J. Amerika

Plegadis falcinellus



Plegadis falcinellus
© Christian Kerihuel 2003

Starý svět

Lophotibis cristata



Madagaskar

Plataleinae

Platalea leucorodia



Starý svět

©JUANNE

Platalea minor



Copyright © Takashi Koike, All Rights Reserved

Asie

Platalea ajaja



© John Picken

Nový svět

Platalea alba

Afrika

Video: www.arkive.org

